



Opis produktu

Metionina: może działać ochronnie na wątrobę (Annu Rev Nutr. 2008;28:273-93.).

Glicyna: bierze udział w wielu przemianach w organizmach żywych. Może działać korzystnie na wątrobę (J Pharmacol Exp Ther. 1998 Aug;286(2):1014-9.).

Glicyna wraz z kwasem glutaminowym i cysteiną wchodzi w skład związku o nazwie Glutathion. Glutathion jest produkowany w każdej komórce organizmu żywego ale jego powstawanie zachodzi głównie w wątrobie, przy udziale witaminy C. Jest bardzo dobrym, występującym w wątrobie czynnikiem wiążącym toksyczne substancje.

DAA (prawoskrętny analog kwasu L-asparaginowego): powstaje w naturalnych warunkach w organizmie w przysadce mózgowej, jądrach oraz podwzgórzu. DAA powoduje wzrost hormonu luteinizującego(LH), hormonu niezbędnego do wytwarzania testosteronu (FEBS Letters, Volume 454, Issue 3 July 09, 1999 Pages 317-320, FASEB J. 2000 Apr;14(5):699-714). Hormon ten odgrywa kluczową rolę w procesach spermatogenezy.

Cynk: jest niezbędnym kofaktorem do działania wielu enzymów biorących udział w detoksykacji organizmu, jest boosterem testosteronu. Może korzystnie wpływać na wątrobę (Nutr Clin Pract. 2012 Feb;27(1):8-20., Nature Communications, 2017; 8: 15245).

Informacja żywieniowa	1 kapsułka	2 kapsułki
Ekstrakt karczocha	100 mg	200 mg
w tym cynaryny (5%)	5 mg	10 mg
Glicyna	100 mg	200 mg
Lecytyna	75 mg	150 mg
Ekstrakt żurawiny wielkoowocowej	50 mg	100 mg
w tym proantocyjanidyny (10%)	5 mg	10 mg
Kwas D-asparaginowy	50 mg	100 mg
L-glutamina	50 mg	100 mg
L-cysteina	40 mg	80 mg
L-metionina	35 mg	70 mg
Ekstrakt ostropestu plamistego	25 mg	50 mg
w tym sylimaryna (80%)	20 mg	40 mg
L-asparaginian L-ornityny	25 mg	50 mg
of which L-ornityna	12,5 mg	25 mg
Ekstrakt czosnku	20 mg	40 mg
w tym potencjał allicyny	0,4 mg	0,8 mg
Wit. E (mg α-TE)	6 mg (50%*)	12 mg (100%*)
Cynk (Albion®)	1,5 mg (15%*)	3 mg (30%*)
Wit. A (μg RE)	120 μ g (15%*)	240 μ g (30%*)
Selen	27,5 μ g (50%*)	55 μ g (100%*)

*RWS – referencyjne wartości spożycia.

Dawkowanie: 1-2 kapsułki dziennie – po posiłku i/lub na ok. 1 godz. przed snem, popijając dużą ilością wody lub inaczej po konsultacji z lekarzem.